

2019年4月9日

各 位

大日本住友製薬株式会社

## 2型糖尿病治療剤 Imeglimin の日本でのフェーズ3試験(TIMES 1試験)の 良好な解析結果の速報について

大日本住友製薬株式会社(本社:大阪市、代表取締役社長:野村 博)は、本日(4月9日)、2型糖尿病を対象として Poxel SA(本社:フランス リヨン、CEO:Thomas Kuhn、以下「Poxel 社」と共同で日本において開発中の imeglimin(一般名、以下「本剤」)のフェーズ3試験の一部を構成する TIMES 1試験について、主要評価項目および主な副次評価項目を達成したという、良好な解析結果の速報を得ましたので、お知らせします。

TIMES 試験(Trials of IMeglimin for Efficacy and Safety)は、TIMES 1試験を含む3本の臨床試験から構成され、1,100人を超える2型糖尿病患者を対象に本剤の有効性および安全性を評価しています。

TIMES 1試験は、213人の日本人の2型糖尿病患者を対象とした、24週間、二重盲検比較、プラセボ対照、無作為化、単剤療法試験であり、本剤1,000mgを1日2回経口投与しました。

TIMES 1試験の結果、主要評価項目である投与24週間後のHbA1cのベースラインからの変化量において、本剤投与群はプラセボ投与群に対し、統計学的に有意な改善(本剤投与群の対プラセボ投与群補正平均変化量: -0.87%、 $p < 0.0001$ )を示し、本剤が糖尿病管理において有効であることが示唆されました。また、TIMES 1試験の主な副次評価項目である、投与24週間後の空腹時血糖(FPG)のベースラインからの変化量において、本剤投与群はプラセボ投与群に対し、統計学的に有意な改善(本剤投与群の対プラセボ投与群補正平均変化量: -19 mg/dL、 $p < 0.0001$ )を示しました。他の副次評価項目については、解析中です。

本剤は、本試験において総じて良好な忍容性を示し、本試験における有害事象は、本剤の日本でのフェーズ2b試験ならびに米国、欧州でのフェーズ1試験およびフェーズ2試験で観察された内容と一致していました。

本試験の詳細データは、Poxel社が今後の学会で発表する予定です。

TIMES 3試験の16週間の速報結果は2019年中頃に、TIMES 2試験およびTIMES 3試験の全期間の速報結果は2019年末に発表する予定であり、日本での本剤の新薬承認申請は、2020年に行うことを目指しています。

以 上

(ご参考)

### 【Imeglimin について】

Imeglimin は、世界保健機関(WHO)によって新たな化合物クラスである「Glimins」として登録されており、同クラスとして初めて臨床試験が実施されている化合物です。本剤は、ミトコンドリアの機能を改善するという独自のメカニズムを有しており、また、2型糖尿病治療において重要な役割を担う3つの器官(肝臓・筋肉・膵臓)において、グルコース濃度依存的なインスリン分泌の促進、インスリン抵抗性の改善および糖新生の抑制という作用を示し、血糖降下作用をもたらすことが期待されています。さらに、本剤の作用機序は、糖尿病によって引き起こされる細小血管・大血管障害の予防につながる血管内皮機能および拡張機能の改善作用や、膵臓β細胞の保護作用を有する可能性も示唆されています。本剤は、2型糖尿病治療における単剤および併用による血糖降下療法において、幅広く使用される治療薬となる可能性があります。

大日本住友製薬は、本剤の日本、中国、韓国、台湾および東南アジア9カ国を対象とした開発・販売提携契約を2017年10月にPoxel社と締結しています。

### 【Poxel社について】

Poxel社は、2009年に設立された、フランスに本社を置く、フランス株式市場上場の製薬企業です。2型糖尿病や非アルコール性脂肪肝炎(NASH)を含む代謝性疾患を対象とした医薬品の研究開発に注力し、開発パイプラインの拡大を推進しています。詳細については、<https://www.poxelpharma.com/ja> をご覧ください。

### 【TIMES 試験について】

TIMES 試験は、2型糖尿病を対象とした imeglimin の日本におけるフェーズ3試験であり、1,100人を超える患者を対象に本剤1,000mgを1日2回投与する3本の臨床試験から構成されています。

- ・TIMES 1: 日本人2型糖尿病患者を対象とした24週間の imeglimin 単剤療法による有効性、安全性および忍容性を検討するプラセボ対照二重盲検比較、無作為化試験  
(主要評価項目: HbA1c の変化量、副次的評価項目: 空腹時血糖(FPG)およびその他の標準的な血糖・非血糖パラメーター)
- ・TIMES 2: 日本人2型糖尿病患者を対象とした52週間の imeglimin 単剤療法および imeglimin と他の経口血糖降下剤(DPP-4 阻害薬、SGLT2 阻害薬、ビッグアナイド薬、SU薬、GLP-1受容体作動薬)との併用療法による長期での安全性および有効性を検討するオープンラベル、並行群間比較試験
- ・TIMES 3: 日本人2型糖尿病患者およびインスリン製剤を使用して効果不十分な日本人2型糖尿病患者を対象とした imeglimin とインスリン製剤との併用療法による有効性および安全性を検討する16週間のプラセボ対照、無作為化、二重盲検比較試験、およびその後36週間の継続投与オープンラベル試験

○本件に関するお問い合わせ先

大日本住友製薬株式会社 コーポレートコミュニケーション部  
(大阪) TEL 06-6203-1407/(東京) TEL 03-5159-3300